

NIEUWSBRIEF FLORON-FWT, NR.2, APRIL 1990

Uit het veld

Bosgeelster (*Gagea lutea*) aan de Schipbeek

P.F. Stolwijk

Op zondag 18 maart jl. maakte ik een wandeling langs de Schipbeek, even oost van Rietmolen (coördinaten 243-461). Vele planten waren al, tegen het droge, zonbeschenen talud van de noordoever, in bloei gekomen, zoals Klein tasjeskruid (*Teesdalia nudicaulis*), Driekleurig viooltje (*Viola tricolor*) en Akkerviooltje (*Viola arvensis*), naast Vroegeling (*Erophila verna*), Zandraket (*Arabidopsis thaliana*) en Zandhoornbloem (*Cerastium semidecandrum*). De oever was helemaal blauw gekleurd door de volop bloeiende Draadereprijs (*Veronica filiformis*), die aan de Schipbeek veelvuldig aan te treffen is. Daartussen hier en daar de gele kleur van Speenkruid (*Ranunculus ficaria*).

Plotseling zag ik bij een plekje met Speenkruid een afwijkende kleur geel, meer geelgroen. Ik had de Bosgeelster (*Gagea lutea*) betrappt, een plant die ik hier niet verwacht had. Het was een bescheiden groeiplaats; ik telde slechts drie bloei-stengels. Vegetatieve (niet-bloeiende) exemplaren kon ik niet vinden.

Aanvankelijk meende ik dat deze soort aan de Schipbeek niet eerder was gevonden. Dat bleek onjuist. In 1973 is de Bosgeelster door Temminck uit Haaksbergen gezien in atlasblok 34.38, 15 km oostelijker, op het traject bij de Duitse grens. Toen was deze soort nog slechts van een plaats in Twente bekend. Gericht zoeken langs de Dinkel door o.a. Rudi Zielman en Johan Kers bracht vervolgens echter veel vindplaatsen aan het licht.

Het is overigens best mogelijk dat de soort op meer plaatsen langs de Schipbeek te vinden is. Zo vroeg in het jaar wordt daar vast niet vaak geïnventariseerd en zo kan deze plant met zijn korte vegetatieperiode aan de aandacht ontsnappen.

Misschien kan aan het eind van dit seizoen een compleet overzicht van de Twentse groeiplaatsen van de Bosgeelster gegeven worden.
