

NIEUWSBRIEF FLORON-FWT, NR.17, SEPTEMBER 1997

Excursieverslagen FLORON-FWT 1996

P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra

DE LUTTE, 11 mei 1996; 11 deelnemers.

Tijdens onze voorjaarsexcursie bezochten we drie kilometer-blokken oost van De Lutte. Het eerste km-blok (265-482, Lage Hoek) leverde 189 soorten op. In houtwallen vonden we onder meer Bosanemoon (*Anemone nemorosa*), Muskuskruid (*Adoxa moschatellina*) en Grote muur (*Stellaria holostea*). De berm van de Losserse dijk bleek hier en daar heischraal, met Struikhei (*Calluna vulgaris*), Stelkelbrem (*Genista pilosa*) en Blauwe knoop (*Succisa pratensis*). Driekleurig viooltje (*Viola tricolor*) en Bittere wilg (*Salix purpurea*) verraadden de nabijheid van de Dinkel. In het loofbosje langs de Bloemenbeek bij boerderij 'op Aust' zagen we Gele dovenetel (*Lamium galeobdolon*), Bittere veldkers (*Cardamine amara*), Witte klaverzuring (*Oxalis acetosella*), Dubbelloof (*Blechnum spicant*) en (het van hier al bekende) Verspreidbladig goudveil (*Chrysosplenium alternifolium*).

Tot onze verrassing ontdekten we aan een rechtgetrokken traject van de Bloemenbeek langs de Beuningerstraat (264-482) een nieuwe groeiplaats van Verspreidbladig goudveil. Vlakbij het beginpunt gekomen tenslotte vonden we onderaan het talud van de zuidelijke berm van de weg Oldenzaal-Gildehaus een populatie Blauwe zegge (*Carex panicea*) en een enkel exemplaar Schraallandpaardebloem (*Taraxacum celticum* s.l., microsoort *T. frugale*).

's Middags noteerden we in km-blok 267-481 (De Poppe) nog 150 soorten, voornamelijk langs het spoor. Kaal breukkruid (*Herniaria glabra*) Akkerhoornbloem (*Cerastium arvense*) en Driekleurig viooltje waren hier de leukste soorten.

RIJSSEN, 9 juni 1996; 8 deelnemers.

Tijdens de excursie werden 4 km-blokken aangedaan.

In 233-482 ('t Mensink) noteerden we de meeste soorten: 169. De leukste vondst in dit blok betrof een aantal forse planten Gevlekte scheerling (*Conium maculatum*) aan het spoor. Langs de weg Rijssen-Wierden zagen we Hertshoornweegbree (*Plantago coronopus*) en Deens lepelblad (*Cochlearia danica*). Km-blok 233-483 (Grimbergerveld) leverde 142 soorten op. In de berm van de Grimbergerweg troffen we onder meer Grote pimpernel (*Sanguisorba officinalis*), Oostenrijkse kers (*Rorippa austriaca*), Hemelsleutel (*Sedum telephium*) en Koningsvaren (*Osmunda regalis*) aan. In de naast gelegen sloot vonden we hier en daar Rosse vossenstaart (*Alopecurus aequalis*). In 232-483 (Notter) werd laatstgenoemde soort ook gezien. Van de overige 77 soorten die we in dit km-blok streepten, waren Oostenrijkse kers en Valse akkerkers (*Rorippa x armoracioides*) wel de leukste. Valse akkerkers vonden we ook in 232-482 (Grimberger hooiland); deze hybride kennen we inmiddels van 26 km-blokken. Aardige soorten in het laatste km-blok (97 soorten) waren verder Zandzegge (*Carex arenaria*) en Koningsvaren.

DEDEMSVAART, 22 juni 1996; 4 deelnemers.

Het doel van deze excursie: voor ons tot dan toe onbekend terrein, het grensgebied met Drenthe in het uiterste noordwesten van ons district, bleek een goede keus.

Voor het eerst noteerde de werkgroep Moeraslathyrus (*Lathyrus palustris*); we vonden tientallen planten aan de rand van verruigd rietland ten zuiden van het riviertje de Reest (228-515). Ook groeide hier plaatselijk Veenreukgras (*Hierochloa odorata*). Onze laatste vondst van deze soort dateerde van 1987, bij Hankate. In een naastgelegen onbemest grasland streepten we tien Zegge-soorten, waaronder Blauwe zegge (*Carex panicea*), Geelgroene zegge (*Carex oederi* subsp. *oedocarpa*) en de zeldzame Draadzegge (*Carex lasiocarpa*). De Reest leverde onder meer vier Fonteinkruiden op: Drijvend fonteinkruid (*Potamogeton natans*). Tenger fonteinkruid (*Potamogeton pusillus*). Haarfonteinkruid (*Potamogeton trichoides*) en Plat fonteinkruid (*Potamogeton compressus*). De laatste lijkt in ons district beperkt tot het gebied ten noorden van de Overijssels Vecht. Vermeldenswaard zijn verder Grote pimperl (*Sanguisorba officinalis*) in een berm en Knolboterbloem (*Ranunculus bulbosus*), Kruipganzerik (*Potentilla anglica*) en Kleine varkenskers (*Coronopus didymus*) op een begraafplaats van Noord-Stegeren (228-514).

STOKKUM, gem. Markelo, 31 augustus 1996; 10 deelnemers.

Doel van deze excursie was de (noordelijke) oever van het Twentekanaal, twee km-blokken waarin nog weinig geïnventariseerd was.

De oever bleek niet bijster interessant. De belangrijkste vondsten werden gedaan aan de Kooidijk en aan de spoorlijn met de bermsloten: Bitterkruid (*Picris hieracioides*); Groot warkruid (*Cuscuta europaea*), hier van 1986 al bekend; Gewone duivekervel (*Fumaria officinalis*), in Twente minder algemeen dan Middelste duivekervel (*Fumaria muralis*); Loos blaasjeskruid (*Utricularia australis*) en Rode waterereprijs (*Veronica catenata*), beide uit deze omgeving al bekend; Oeverzegge (*Carex riparia*), Kleine lisdodde (*Typha angustifolia*) en Bultkroos (*Lemna gibba*), in Twente niet algemeen, maar uit deze streek ook al bekend.

De opmerkelijkste vondst betreft Kale gierst (*Panicum dichotomiflorum*) of een naaste verwant *Panicum schinzii*.
