

Aspecten van de Twentse flora

Stroomdalsoorten


J.W. Bielen & P.F. Stolwijk

Hierbij presenteren we een viertal kaarten van soorten die een interessant verspreidingspatroon te zien geven in het FLORON-district Twente. Het gaat om stroomdalsoorten waarvan de hier getoonde verspreiding vrij compleet zal zijn, ondanks de lacunes in de inventarisatie van ons district. Drie soorten - Groot warkruid (*Cuscuta europaea*) **kaart 1**, Steenanjer (*Dianthus deltoides*) **kaart 2**, en Geel walstro (*Galium verum*) **kaart 3** - zijn in hun natuurlijke voorkomen vrijwel beperkt tot de dalen van Overijsselse Vecht, Regge, Schipbeek en Dinkel met uitstraling langs het Kanaal Almelo-Nordhorn. Kleine bevernel (*Pimpinella saxifraga*) **kaart 4** valt bovendien op door haar voorkomen in de omgeving van Vasse.


Groot warkruid komt ook op enkele plaatsen langs de spoorlijn Goor-Delden voor.

Ook Lange ereprijs (*Veronica longifolia*) behoort tot de groep soorten die voornamelijk langs Overijsselse Vecht en Dinkel met Kanaal Almelo-Nordhorn voorkomen.


De stroomdalflora was vroeger rijker. Maar soorten als Voorjaarszegge (*Carex caryophylla*), Kattendoorn (*Ononis repens* subsp. *spinosa*), beide aan de Overijsselse Vecht en de Dinkel, en Gewone agrimonie (*Agrimonia eupatoria*) aan de Dinkel, zijn tegenwoordig erg zeldzaam.




Kaart 1 Groot warkruid



Kaart 2 Steenanjer



Kaart 3 Geel walstro



Kaart 4 Kleine bevernel